





NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA

Podančica (*Enterobius vermicularis*) je majhna, približno centimeter velika glista, belkaste barve. Uvrščamo jo med notranje zajedalce človeka. Samica vali jajčeca, ki so ovalne oblike, v njih se nahaja ličinka. Jajčeca odlaga v okolico zadnjika, kar povzroča značilno srbenje.

Okužbo s podančico dokažemo z opazovanjem jajčec (iz odtisa zadnjika) pod mikroskopom. Odrasle podančice lahko vidimo v okolici zadnjika tudi s prostim očesom. Podančic v vzorcu blata običajno ne najdemo, ker samica leže jajčeca v nočnem času v toplo in vlažno kožo gub ob zadnjiku, kjer ostanejo prilepljena.

Odtis odzvamemo s pomočjo lepljivega celofanskega traku, napetega z lepljivo stranjo navzven preko lesene spatule. Pripravljen celofanski trak dobite v laboratoriju.

Pacient odzame zjutraj (**pred uriniranjem, iztrebljanjem in umivanjem**) odtis kožnih gub ob zadnjiku.



Leseno spatulo s celofanskim trakom odtisnite na oba predela kožnih gub okoli zadnjika.

Leseno spatulo s celofanskim trakom dostavite čimprej v laboratorij. Ob pravilnem odvzemu se na celofanskem traku vidi odtis zadnjika v obliki rozete.

Opozorilo za starše:

Večer pred odvzemom otroku dobro umijte ritko, vendar je **NE** mažite s kremo. Otroku odzimate zjutraj (**pred uriniranjem, iztrebljanjem in umivanjem**) odtis kožnih gub ob zadnjiku.

Če je otrok zjutraj odvajal blato, odzjem odtisa preložite na jutro, ko ne bo odvajal.

