

ODVZEM KRVI

Odvzem venske in kapilarne krvi izvaja laboratorijsko osebje z opravljenim dodatnim izobraževanjem. Odvzem opravijo po priporočenih standardnih postopkih za odvzem krvi in z materialom za enkratno uporabo, kar osebju in pacientom zagotavlja zaščito pred okužbo.

PRIPOROČILA PREISKOVANCEM PRED ODVZEMOM KRVI

Za odvzem krvi morate biti tešči, razen če Vam zdravnik ni naročil drugače. Če tega ne boste upoštevali, so lahko rezultati preiskav napačni.

12 ur pred odvzemom krvi ne jejte nobene hrane, pijete lahko le vodo v običajnih količinah.

Pred odvzemom krvi ne smete zaužiti jutranje kave.

Če ste dan pred odvzemom krvi imeli zabavo in ste prekomerno uživali v jedi in pijači Vam odsvetujemo odvzem krvi.

24 ur pred odvzemom bodite normalno telesno aktivni. Če je mogoče, se pred odvzemom krvi izogibajte večjim športnim aktivnostim in težjim fizičnim naporom.

15 minut pred odvzemom krvi se je potrebno usesti in umiriti.

PROSIMO, DA UPOŠTEVATE VRSTNI RED.

Prednost pri odvzemu krvi imajo bolniki z oznako NUJNO in bolniki na invalidskih vozičkih z uradnim spremstvom.

V kolikor Vam je ob odvzemu krvi rado slabo, na to pred odvzemom krvi opozorite laboratorijsko osebje.

Pred odvzemom krvi nujno opozorite laboratorijsko osebje, če ste na antikoagulantni terapiji (jemljete Marivarin, Plavix, Aspirin...).

PRIPOROČILA PREISKOVANCEM PO ODVZEMU KRVI

Po odvzemu krvi se usedite in na iztegnjeni roki s prsti tiščite tampon 5 do 10 minut. Krvavitev mora v tem času prenehati, če ne preneha vstopite ponovno v laboratorij.

Po odvzemu krvi so možni določeni zapleti, kot so krvavitev iz vbodne rane in nastanek hematoma (izliv krvi v podkožno tkivo). V primeru nastanka hematoma si kožo hladite z obkladki. Če bolečina dalj časa ne pojenja se posvetujte z osebnim zdravnikom.

Opozorilo: Hematom lahko nastane tudi ob pravilnem ravnanju pred med in po odvzemu krvi.